



PARTO OPERATÓRIO CESÁRIO

Dra. Marília da Glória Martins




Indicações

- Desproporção cefalopélvica
- Discinesias
- Distocias das partes moles
- Apresentações anômalas
- Placenta prévia
- Descolamento prematuro da placenta




Indicações

- Doença hemolítica perinatal
- Sofrimento fetal agudo ou crônico
- Morte habitual do feto ou do recém-nascido
- Prolapso ou procidência de cordão
- Toxemia tardia da prenhez
- Pós-maturidade
- Diabete




Indicações

- Primípara idosa
- Passado de partos laboriosos.
- Antecedentes de cirurgias ginecológicas.
- Câncer genital.
- Condilomatose vulvar.
- Herpes genital.
- Atos tocúrgicos intentados e frustrados
- Morte da gestante com feto presumivelmente vivo



Técnica

- Ambiente cirúrgico
- Anestesia peridural, raque anestesia, narcose pelo pentabarbital sódico (tionembutal)
- Anti-sepsia e colocação dos campos operatórios
- Paciente em posição de Trendelenburg moderada
- Obstetra colocado à esquerda da paciente
- Abertura do ventre, incisão de Pfannenstiel



Dificuldades, acidentes e complicações

■ HEMORRAGIAS


■ EXTRAÇÃO FETAL DIFÍCIL

■ ADERÊNCIAS

Dificuldades, acidentes e complicações

ADERÊNCIAS

1. Vesicais




À parede abdominal

À parede do útero

À bexiga

2. Intestinais


Desfazimento delicado no decorrer do ato cirúrgico



Dificuldades, acidentes e complicações

HEMORRAGIAS


- Por lesões dos grandes pedículos vasculares.
- Provindas dos próprios lábios da histerotomia.
- Originárias de anomalias vasculares regionais.
- Por hipotonia uterina.
- Hemorragias tardias.




OPERAÇÕES COMPLEMENTARES

- Hérnia estrangulada.
- Apendicite aguda.
- Torção de tumor genital.
- Retirada de cicatriz da laparotomia anterior.
- Desfazimento de aderências.
- Esterilização cirúrgica pela ligadura, secção ou exérese das trompas.

Técnica




Esterilização cirúrgica pelo método de Pomeroy




ANTIBIOTICOTERAPIA PROFILÁTICA

- Cefazolina 1g EV 30 minutos antes do procedimento
- Cefazolina 1 g EV ou ampicilina 1 g EV em dose única após a ligadura do cordão umbilical



COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

- Hemorragias pós-operatórias.
- Lesões vesicais.
- Lesões ureterais.
- Fístulas: vesicovaginais, úterovaginais e retovaginais.
- Acidentes tromboembólicos.
- Morbidade puerperal.
- Mortalidade materna.



PROGNÓSTICO

- Mortalidade materna: 5 a 10 x maior
- Morbidade: 5 a 20 x superior
 - ↳ fatores de risco: toques vaginais repetidos, anemia, obesidade, baixo nível sócio-econômico
- Mortalidade perinatal