TERAPIA ANTIBIÓTICA NA PREVENÇÃO DO PARTO PRÉ-TERMO E NA RUPTURA PREMATURA PRÉ-TERMO DE MEMBRANAS

Marília Da Glória Martins

Disciplina de Obstetrícia

Departamento Materno-Infantil - HU -
UFMA

INTRODUÇÃO

22 milhões de crianças nascem prematuramente a cada ano no mundo inteiro.

7 milhões morrem anualmente no período perinatal.

8 milhões morrem no primeiro ano de vida.

98% ocorrem na Ásia, África e América Latina e 2% nos países industrializados.

Kurjak,
2001

INTRODUÇÃO

INCIDÊNCIA DE PARTO PRÉ-TERMO

Escócia - Hall et al, 1985	6,8%
França - Papiernik et al, 1985	5,6%
Alemanha - Keirse, 1995	4,0%
USA - Stetzer & Mercer, 2000	11,0%
América Latina - Bertini et al, 1997	10 - 43%
EPM- UNIFESP - Bertini et al, 1997	20 - 22%
UNIFESP - GOMEZ, 1999	10 - 12%

Pretermidade

13 milhões de partos pré-termo ocorrem anualmente em todo o mundo
Principais causas de morbidade e mortalidade neonata
75-90% de todos os óbitos neonatais não devidos a malformações
1/3 devido ao TPP e 40% à RPPM

INTRODUÇÃO

NASCIMENTO PRÉ-TERMO

Após a 30^a semana

Sobrevivida de 90 %

Antes da 29^a semana

Mortalidade de 66 %

BOCKING et al., 1999; ANDREWS et al., 2000; GIBB et al., 2001; SZABÓ et al., 2001

INTRODUÇÃO

FATORES PREDISPONENTES

situação socioeconômica
e cultural precária

assistência pré-natal
inadequada ou ausente

maior prevalência de
infecções geniturinárias

INTRODUÇÃO

Terapia antibiótica na prevenção do parto pré-termo

Dos sistemas genitais, urinário e
anotímico.

Microrganismos no Líquido Amniótico em 618 casos de RPPM

Microrganismo	Prevalência
<i>Mycoplasma</i>	20.9
<i>Streptococcus</i>	3.5
<i>Peptostreptococcus</i>	2.3
Bacteroides	3.4
<i>Gardnerella vaginalis</i>	3.4
<i>E. Coli</i>	1.6
<i>N. gonorrhoeae</i>	1.1
<i>Candida albicans</i>	0.8

Cultura Positiva de Líquido Amniótico em RPPM

Author	Nº	Porcentagem
Garite,82	86	23
Cotton,84	41	14
Vintzileos,86	54	22
Romero,88	221	29
Gauthier,92	111	48
Carrol,95	82	36

Média de 24%

Microrganismos no Líquido Amniótico e 618 casos de RPPM

K. Nico Laides, 96

Microrganismo	Prevalência
Mycoplasma	20.9
Streptococcus	3.5
Peptostreptococcus	2.3
Bacteroides	3.4
Gardnerella vaginalis	3.4
E. Coli	1.6
N. gonorrhoeae	1.1
Candida albicans	0.8

VIAS DE CONTAMINAÇÃO AMNIÓTICA

ascendendo por via vaginal e cérvix;
por disseminação hematogênica;
através da cavidade peritoneal por
movimento retrógrado; introdução acidental
em procedimentos invasivos.

RUPTURA PREMATURA PRÉ-TERMO DE MEMBRANAS

Bacterioscopia de secreção vaginal em 46 casos no HU-UMI

	RPPM %	CONTROLE %
<i>Trichomonas</i> NS	30.2	24.2
<i>Cândida sp.</i> NS	27.9	31.6
<i>Clamídia t.</i> NS	23.2	15.4
<i>Gardnerella</i> NS	2.4	4.2
<i>N. gonorrhoea</i> NS	2.4	2.4

Martins, M.G 2001

VIAS DE CONTAMINAÇÃO FETAL

Vias de contaminação da cavidade amniótica

- î Ascendendo por via vaginal e cérvice
- î Por disseminação hematogênica
- î Através da cavidade peritoneal
- î Por introdução acidental em procedimentos invasivos como amniocentese

Blanc, 1964; Driscoll, 1965

Físioopato

Logia

Decídua
amnion

Bactéria

Líquido
Amniótico

FAP

Fator
ativador de
plaquetas

Monócitos

- || Citocinas: Interleucinas 1 e 6 &
- || Fator de Necrose Tumoral
- || Ácido Araquidônico
- || Prostaglandinas E2 e F2_α

Miométrio

Contrações uterinas TPP e RPPM

Antibióticos em TPP e Parto Pré -Termo

Uso de antibiótico em RPPM

Cochrane Database, 1994

ORACLE

MRC Preterm Antibiotic Uncertainty Study

Estudo randomizado, multicêntrico, duplo cego, controlado
Trabalho de Parto Prematuro, RPPM

2.500 Placebo	2.500 Amox - placebo + Eritro	Sub-tota 1: 5.000 Amox - placebo
2.500 Amox + Eritro placebo	2.500 Amox + Eritro	Sub-tota 2: 5.000 Amox - ativa
Sub-tota A: 5.000 Eritro placebo	Sub-tota B: 5.000 Eritro ativa	Tota 1: 10.000

Amoxicilina (250mg) +
Ac. Clavulânico (125mg)
Eritromicina (250mg)

Antibiótico e Mortalidade Perinata

Autor

Tratado Controlo

IC 95%

0.1

0.3

0.5

1

2

4

Meior

pior

Antibiótico e Mortalidade Perinata

Autor

Tratado Controlo

IC 95%

Desfechos Maternos e neonata is em casos de RPPM a Locadas er í troM í c í na

ORACLE

Lancet 357, March 31, 2001

	Erythro 1190	Placebo 1225	p	
Parto até 48h	34.8%	40.7	0.004	*
Peso nascimento	2120 (766)	2072 (769)		0.32
Surfactante	14.8%	17.7%	0.05	*
Adm UTIN	70.3%	71.8%	0.39	
SDR	19.8%	21.7%	0.25	
Hemocultura positiva	5.7%	8.2%	0.02	*
ECN	0.9%	0.5%	0.20	
O ₂ at 36 weeks	5.5%	6.2%	0.49	
Abnormal brain US	4.2%	5.0%	0.36	
Mortes	5.9%	6.7%	0.41	
Desfecho primário comp	12.7%	15.2%	0.08	*

Antibiótico e Infecção Puerperal

Antibiotic coverage RPPM e Correlation site

Desfechos Maternos e neonatais e casos de RPPM alocados a oxitocina

ORACLE

Lancet 357, March 31, 2001

	Co-amoxi 1205	Placebo 1225	p	
Parto até 48h	30.5%	40.7	<0.0001	*
Peso nascimento	2083 (755)	2072 (769)	0.69	
Surfactante	15.1%	17.7%	0.08	*
Adm UTIN	70.4%	71.8%	0.42	
SDR	20.0%	21.7%	0.3	
Hemocultura positiva	5.7%	8.2%	0.02	*
ECN	1.9%	0.5%	0.001	*
O ₂ at 36 weeks	5.7%	6.2%	0.62	
Abnormal brain US	3.8%	5.0%	0.16	
Morte	6.6%	6.7%	0.89	
Desfecho primário comp	12.7%	15.2%	0.08	*

Antibiotic coverage RPPM e Correlation site

Características básicas de 81 gestantes complicadas por TPP e RPPM

	Metronidazol/ Amoxicilina (N = 41)		Placebo (N = 40)		Total (N = 81)	
	N	%	N	%	N	%
Média idade materna (anos)	22,8	5,4	22,4	4,7	22,6	5,1
Id. gestacional na entrada (média)	30,2	2,5	30,5	2,0	30,3	2,8
< 26 semanas	01	2,4	00		01	1,2
26 - 28	11	26,8	07	17,5	18	22,2
29 - 31	14	34,1	17	42,5	31	38,3
32 - 34	15	36,6	16	40,0	31	38,3
Dilatação cervical (cm)						
0 - 1	27	65,9	24	60,0	51	63,0
2 - 3	12	29,3	14	35,0	26	32,1
≥ 4	02	4,9	02	5,0	04	4,9
Drogas prescritas						
Esteróides	41	100	40	100	81	100
B- agonistas	40	97,6	40	100	80	98,8
Indometacina	01	2,4	00	-	01	1,2

Uso de antibiótico e RPPM

Cochrane Database, 1994

Parto até 7 dias

Corioamnionite

Infecção Puerpera

Infecção Neonata

Hemorragia pospartiva

SDR

Mortalidade Neonata

Odds Ratio (95% CI)

Melhora

Piora

Distribuição das 81 pacientes em relação ao prolongamento da gestação

Pro Longamento da gravidez	Antibióticos N = 41	%	Placebo N = 40	%	P	x²
Parto até 48 horas	05	12,1	20	50,0	0.0006	11.85
Parto até 7 dias	13	31,7	06	15,0	0.13	2.29
Parto até 15 dias	10	24,3	08	20,0	0.83	0.04
Parto até 20 dias	02	4,8	04	10,0	0.32	0.21
Parto até > 21 dias	11	26,8	02	5,0	0.01	5.63
Média (dias)	13 dias		8 dias			

Distribuição das 34 pacientes com trabalho de parto pré-termo

com bolsa íntegra em relação ao prolongamento da

Prolongamento da gravidez	Antibióticos	gestação		%	P	x ²
	N = 17	placebo	N= 17			
Parto até 48 h	00	-	05	29,4	0.02	3.75
Parto até 7 dias	05	29,4	05	23,5	0.70	0.14
Parto até 15 dias	03	17,6	03	17,6	0.67	0.20
Parto até 20 dias	01	5,9	03	17,6	0.30	0.28
Parto >21 dias	08	47,1	01	5,9	0.01	4.50
Média em dias	15,6		10,0			

Distribuição das 47 pacientes com ruptura prematura pré-termo de membranas em relação ao prolongamento da gestação

Pro Longamento da gravidez	Antibiótico tícos N = 24	%	Placebo N= 23	%	P	x ²
Parto até 48 h	05	20,8	15	56,5	0.005	7.74
Parto até 7 dias	08	33,3	01	13,0	0.02	4.64
Parto até 15 dias	07	29,2	05	13,0	0.80	0.06
Parto até 20 dias	01	4,16	01	17,3	0.74	0.48
Parto >21 dias	03	12,5	01	-	0.32	0.23
Média em dias	10,5		6,6			

Distribuição das 81 pacientes em relação à morbidade e mortalidade neonatal

Morbidade e mortalidade neonatal	Antibióticos		Placebo		P	x ²
	N = 41	%	N= 40	%		
SDR	09	21,9	16	40,0	0.08	3.05
USTF anormal	02	4,8	08	20,0	0.03	3.00
Enterocolite necrosante	00		00			
Sepse neonatal	03	7,3	08	20,0	0.17	1.80
Óbito	01	2,4	02	5,0	0.49	0.00

Distribuição das 34 pacientes em relação à morbidade e mortalidade neonatal em parto pré-termo com bolsa íntegra

Morbidade e mortalidade neonatal	Antibióticos N = 17	%	Placebo N = 17	%	P	χ^2
SDR	02	17,7	06	35,2	0.11	1.47
Sepse neonatal	00		02	17,7	0.24	0.53
USTF anormal	00	00	02	17,7	0,24	0,53
Enterocolite necrosante	00		00			
Óbito	00		00			

Distribuição das 47 pacientes com ruptura prematura pré-termo de membranas em relação à morbidade e mortalidade neonatal

Morbidade e mortalidade neonatal	Antibióticos N = 24	%	Placebo N= 23	%	P	χ^2
SDR	07	29,2	10	43,4	0.47	0.51
USTF anormal	02	8,3	06	42,9	0.12	1.35
Enterocolite necrosante	00		00			
Sepse neonatal	03	12,5	06	42,9	0.20	0.66
Óbito	01	4,2	02	8,7	0.48	0.00

Distribuição das 81 pacientes em relação aos resultados maternos

Morbidade materna	Antibióticos N = 41	%	Placebo N= 40	%	P	x²
Corioamnionite	01	2,4	04	10,0	0.17	0.91
Morbidade febril puerperal	03	7,3	07	17,5	0.14	1.11
Média de permanência no hospital	7,4		8,3			

Distribuição das 34 pacientes em relação aos resultados maternos em parto pré-termo com bolsa íntegra

Morbidade materna	Antibióticos N = 17	%	Placebo N= 17	%	P	x²
Corioamnionite	00		00			
Morbidade febril puerperal	01	5,8	02	11,7	0.5	0.00
Média de permanência no hospital	7,4		9			

Distribuição das 47 pacientes com ruptura prematura pré-termo de membranas em relação aos resultados maternos

Morbidade materna	Antibióticos		Placebo		P	x ²
	N = 24	%	N= 23	%		
Corioamnionite	01	(4,2%)	04	(17,5%)	0.16	0.99
Morbidade febril puerperal	02	(8,3%)	05	(21,7%)	0.17	0.90
Período de latência (dias)	10		07			
Média de permanência no hospital	11,3		12,6			

DISCUSSÃO

ESTUDOS PROSPECTIVOS CONTROLADOS PARA TRATAMENTO DO TPP COM ANTIBIÓTICOS

Autores	Amostra	IG	Antibiótico	Duração	Prolong.
Newton et al (89)	95	24-34	ampic.IV/erit.oral	7 dias	NS
Norman et al (94)	82	26-30	ampic.IV/metron.oral**	5 dias	S
Hauth et al (95)	624	22-34	metron/eritro.oral	10 dias	S
Svare et al (97)	110	26-34	ampic.IV+metro.IV +piper/metron.oral	Até parto	S
Oyarzun et al (98)	173	22-36	amoxic+metro.	10 dias	NS
Kenyon et al (01)	6295	< 37	eritromicina **	10 dias	S
			amox+ac.clav.	10 dias	S

ESTUDOS PROSPECTIVOS CONTROLADOS COM ANTIBIÓTICOS NA RPPM / PERÍODO DE LATÊNCIA

Autores	amostra	IG	antibióticos	duracão / período de latência
Morales et al(88)	165	26-34	ampic/eritr*	10 dias
> 15 dias				
Nadisauskiene(91)	110	26-34	ampic.oral	7 dias
S				
Christmas et al (92)	94	20-34	ampic/gent/clind+	7 dias
S			ampic.ác.clav.	
Mercer er al(97)	614	24-32	ampic+eritr.**	5 dias
S				
Kenyon et al(01)	4826	< 37	eritromicina **	10 dias
S			amox+ac.clav.	10 dias

ESTUDOS PROSPECTIVOS CONTROLADOS COM ANTIBIÓTICOS PARA AVALIAR A MORBIDADE E MORTALIDADE NEONATAL EM RPPM

Autores morb / mort.	N	IG	antibióticos	duração
Gordon et al (74) NS	80	-	ampic.IV/oral	8 dias
Dunlop et al (86) parto S	48	-	cefalex/oral	até o
Nadisauskiene(91) S	110	26-34	ampic.oral	7 dias
Christmas et al (92) NS	94	20-34	ampic/gent/clind+	7 dias
Mercer et al(97) S	614	24-32	ampic.ác.clav. ampic+eritr.**	5 dias
Kenyon et al(01) NS	6295	< 37	eritromicina **	10 dias

ESTUDOS PROSPECTIVOS CONTROLADOS COM ANTIBIÓTICOS PARA AVALIAR A MORBIDADE E MORTALIDADE NEONATAL EM TPP.

Autores	N	IG	antibióticos	duração
Norman et al(94)	82	26-30	ampic.IV/metron.oral**	5 dias
Svare et al(97)	110	26-34	ampic.IV+metro.IV	até o parto
			+piper/metron.oral.	
Oyarzun et al(98)	173	22-36	amoxic+metro.	10 dias
Kenyon et al(01)	6241	> 37	eritomicina	10 dias
			amox+ác.clav.	10 dias

morb / mort

NS

NS

NS

NS

ESTUDOS PROSPECTIVOS CONTROLADOS COM ANTIBIÓTICOS PARA AVALIAÇÃO DA MORBIDADE MATERNA EM RPPM

Autores morb / mort	amostra	IG	antibióticos	duração
Gordon et al(74) S	80	-	ampic.EV/oral	8 dias
Dunlop et al(86) parto S	48	-	cefalex/oral	até o
Christmas et al (92) NS	94	20-34	ampic/gent/clind+ ampic.ác.clav.	7 dias

CONCLUSÕES

CONCLUSÕES

1. A associação de amoxicilina e metronidazol prolonga a gestação e o período de latência.
2. Reduz as morbidades neonatais:SDR, hemorragia intraventricular, sepse e óbito neonatal.
3. Reduz as morbidades maternas: corioamnionite e morbidade febril puerperal.

CONCLUSÕES

4. Uma adequação na terapia antibiótica profilática surge promitente para o tratamento do parto pré-termo e RPPM.
5. A terapia antibiótica associada aos uterolíticos e corticosteróides antenatais, pode ser considerada indispensável para a melhoria do prognóstico materno-fetal.