
VIOLÊNCIA SEXUAL E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE DA MULHER

Doutora Marília Da Glória Martins



A violência contra a mulher é epidemia.



OMS, 2013

Tipos de violência cometida contra a mulher

- ✓ Violência de gênero
- ✓ Violência intrafamiliar
- ✓ Violência doméstica
- ✓ Violência física

Tipos de violência cometida contra a mulher

- ✓ **Violência sexual**
- ✓ Violência psicológica
- ✓ Violência econômica ou financeira
- ✓ Violência institucional



Tipos de atos sexualmente violentos

- ✓ Estupro dentro do casamento ou namoro;
- ✓ Estupro cometido por estranhos;
- ✓ Investidas sexuais indesejadas ou assédio sexual , inclusive exigência de sexo como pagamento de favores;
- ✓ Abuso sexual de pessoas mental ou fisicamente incapazes;
- ✓ Abuso sexual de crianças;
- ✓ Casamento ou coabitação forçados, inclusive casamento de crianças;

Tipos de atos sexualmente violentos


- ✓ Negação do direito de usar anticoncepcionais, ou de adotar outras medidas de proteção contra DSTs;
- ✓ Aborto forçado;
- ✓ Atos violentos contra a integridade sexual das mulheres, inclusive mutilação genital feminina e exames obrigatórios de virgindade;
- ✓ Prostituição forçada e tráfico de pessoas com fins de exploração sexual;
- ✓ Estupro sistemático durante conflito armado.

Violência sexual

Quando a vontade

A sexualidade

A integridade psíquica e corpórea
foram violadas e submetidas à
vontade do agressor



Pela força física, ameaça com armas, agressões físicas
sutis até o extremo do estupro.

Estupro

Do ponto de vista jurídico, segundo o Código Penal, art. 213 “Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça”

A OMS afirma que 1/3 das mulheres de todo o mundo já sofreram violência física e sexual. A maioria delas, cometida pelo parceiro.



Informe de la OMS destaca
que la violencia contra la
mujer es “un problema de
salud global de proporciones
epidémicas”



OMS, 2013

20 DE JUNIO DE 2013 | GINEBRA

La violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial,

Organización Mundial de la Salud (OMS), Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, 2013

-
- ♀ é universal
 - ♀ crime clandestino e sub-relatado
 - ♀ discriminação e pouca credibilidade
 - ♀ uma minoria é denunciada
 - ♀ poucos casos são esclarecidos
 - ♀ atendimento de péssima qualidade
 - ♀ repercussões gravíssimas de cunho íntimo e pessoal

Dados estatísticos

♀ 1/3 de todas as mulheres do mundo são estuprada pelo menos uma vez na vida;

♀ 38% das mulheres são assassinadas pelos seus parceiros;

♀ 42% das mulheres sofreram violência física ou sexual por um parceiro;

♀ 35% a 75% são regularmente espancadas em casa

OMS, 2013

Informação Regional

O relatório apresenta dados regionais de acordo com as regiões da OMS.

Quanto à violência por parceiro, o tipo de violência contra as mulheres em que há mais dados, as regiões mais afetadas foram: **Sudeste Asiático** - com prevalência de 37,7%. Com base em dados agregados de Bangladesh, Timor-Leste (Timor Leste), Índia, Myanmar, Sri Lanka, Tailândia.

Mediterrâneo Oriental - a prevalência de 37%. Com base em dados agregados de Egito, Irã, Iraque, Jordânia, Palestina.

Informação Regional

África - a prevalência de 36,6%. Com base em dados agregados de Camarões, República Democrática do Congo, Etiópia, Quênia, Lesoto, Libéria, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Suazilândia, Uganda, República Unida da Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe.



Estos nuevos datos demuestran que la violencia contra las mujeres es extremadamente frecuente. Necesitamos invertir de manera urgente en la prevención para hacer frente a las causas subyacentes de este problema mundial de la salud de la mujer",

.

Charlotte Watts, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

OMS (Genebra), junho 2013

Estatística

♀ Há 12 milhões de crimes sexuais no mundo

♀ EUA ocorrem 683 mil estupros por ano / 1.871 por dia;

♀ Brasil estima-se $\pm$ 1000 estupros / dia;

♀ SP ocorrem 42 mil estupros por ano, 115 por dia;

♀ A notificação dos casos de violência não atinge 10% dos atos praticados;

Estatística


- ✓ 13% das mulheres conseguem prova material do estupro;
- ✓ Entre 28 a 60% poderão desenvolver DSTs;
- ✓ O risco de infecção pelo vírus HIV está em torno de 0,8 a 2,7%;
- ✓ A estimativa da taxa de gravidez por VS é de 1 a 5%;
- ✓ Nos EUA há cerca de 32 mil gestações anuais por VS.

Estatística

Estima-se que no Brasil
14.298 estupros




Reflexo
físico



Infecções de transmissão sexual adquiridas durante o estupro


DIP e esterilidade



Infecção pelo HIV

Gravidez indesejada

Disfunções sexuais



Associação de VS e desencadeamento de problemas psicossociais

- Dor crônica, distúrbios gastro-intestinais
- Dor mamária
- Distúrbios músculo-esqueléticos
- Depressão recorrente



Reiter et al., 1991; Drossman., 1995; McCauley et al ., 1998;
Faúndes et al., 2000; Linton.,2002;

Associação de VS e desencadeamento de problemas psicossociais

- Distúrbio *boderline* de personalidade
- Problemas de relacionamento interpessoal
- Tendência suicida

McCauley et al.,1998; Whiffen, MacIntosh, 2005; Sar et al.,2007.



Associação de VS a outros eventos

- Dor pélvica crônica uma das principais causas de consultas ginecológicas

Golding et al., 1998

- Dor pélvica , irregularidade menstrual, dispareunia e dismenorréia


Faúndes et al., 2000

- Maior ocorrência de contrações pré-termo

Stenson et al., 2003

Violência Sexual e suas repercussões na saúde da mulher

A violência sexual age na vida da vítima como se fosse um veneno colocado na raiz de uma árvore. Um veneno que consegue sugar a energia e a felicidade, gerando sentimentos ruins.



A violência sexual age na vida da vítima como se fosse um veneno colocado na raiz de uma árvore. Um veneno que consegue sugar a energia e a felicidade, gerando sentimentos ruins.



*Resultado de 7 estudos realizados em comunidades
norte-americanas em mulheres que foram
vitimizadas sexualmente na infância*

Medo

Ansiedade

Abuso de drogas ilícitas


Idéias suicidas

Baixa autoestima



Variáveis	n	%
Aspectos psicológicos		
Medo	107	71,8
Depressão pós-violência (insônia, pesadelos, choro, isolamento e tentativa de suicídio)	42	28,2
TOTAL	149	100,0

Vitimas de violência sexual na infância



Depressão na idade adulta

Morbidade ao longo da vida em torno de 10 a 25%

“Aumenta o risco de enfermidades psiquiátricas”

Lira, L.E.R (2001)

Investigação de impacto Pré-natal

- Transtorno da ansiedade
- Síndrome do pânico
- Transtorno na alimentação
- Abuso do álcool
- Transtornos psiquiátricos



Depressão no período gestacional

Depressão pós-parto


Psicose puerperal




As lembranças de uma agressão sexual parecem ser reavivadas na gravidez. Entretanto, mulheres grávidas têm sido randomizadas em poucos estudos

Benedict et al., 1999; Hobbins ., 2004

Durante a gravidez



Fator de risco para a saúde da mãe
e do concepto



Complicações obstétricas: abortamento,
recém-nascidos prematuros e de baixo peso

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL

Atendimento padrão

- Equipe multiprofissional

Habituada com tais atendimentos

Que possa oferecer mais do que atendimento médico

□ Assistência psicológica para controle e seguimento até a completa reestruturação psicossocial desta mulher e toda a família □ TERAPIA FAMILIAR

