UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIDADE MATERNO INFA
CLÍNICA OBSTÉTRICA

HEMANGIOMA DE PLACENTA

Relato de Caso

MARTINS, M.G; DE AQUINO, N.M.R.; BARROSO, F.V.

DUÇÃO

O hemangioma de placenta ou corioangioma tem incidência variável entre 0,01%
ZEVEDO, 1997) e resulta de defeito na angiogênese dos troncos vilosos primitivos.
A grande maioria destes tumores tem diâmetro inferior a 1 cm. FROELICH et al. em
e hemangiomas de placenta evidenciaram apenas um tumor com cerca de 780 gramas.
Tumores volumosos estão associados à prematuridade e baixo peso, assim como
nascidos de cujas placentas apresentam hemangiomas, costumam exibir pequenas
hemangioma, nevus pigmentoso cutâneo, púrpura trombocitopênica e artéria umbilical
Gestações que cursam com corioangiomas costumam associar-se à toxemia e/ou po

RIÇÃO DO CASO

F.M.C.R., Registro 366199-7, 30 anos, Gesta III Para I (normal a termo) Aborto I
nas e 4 dias (D.U.M.: 03/03/00) foi admitida no serviço de Tocoginecologia - Setor O
e setembro de 2000 referindo ausência de movimentos fetais por 24 horas, dor tipo
mucoso. Ao exame clínico obstétrico: fundo uterino: 27 cm,, bcf + (140 bpm), apr
colo uterino dilatado para 2 cm, bolsa das águas íntegras, metrossístoles presentes (2/
s pré-natal, iniciado no 1º trimestre de gestação. Tabagista há três anos (3 cigarros/di

NÓSTICO

Trabalho de Parto Pré-termo com membranas íntegras.

UTA

Cloridrato de Terbutalina (0,5 mg) 5 ampolas em 500 ml de SG 5%, 40 gotas/min
s cessaram as contrações uterinas. No exame ultra-sonográfico de controle observou
menos 10 X 12 cm e concepto de 26 semanas morto. A terapêutica acima foi suspensa.
dia, feto único, morto, feminino (foto1) e secundamento à Baudelocque-Schultze. Foi s
e anexos e necrópsia do feto (esta última não realizada por não ter sido autorizada pe
ou Hemangioma de placenta.

Foto 1