

**HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL VERSUS  
HISTERECTOMIA VAGINAL SEM PROLAPSO GENITAL:  
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O TEMPO CIRÚRGICO E A  
PERMANÊNCIA HOSPITALAR.**

SOUSA, Márcia da Silva  
FECHINE, Fúlvia Estefânia Padre  
HORTEGAL, Hilmar Ribeiro  
RABELO JÚNIOR, Raimundo Francisco  
NASCIMENTO, Graciete Helena dos Santos  
MARTINS, Marília da Glória.

**Objetivo:** comparar o tempo cirúrgico e o tempo de internação das pacientes submetidas a histerectomia vaginal sem prolapso em relação a histerectomia por via abdominal. **Método:** no período de janeiro a outubro de 2006, foram acompanhadas 157 mulheres submetidas a histerectomia abdominal ou vaginal. Foi utilizado questionário com perguntas abertas e fechadas, onde variáveis foram separadas de acordo com as etapas pré-estabelecidas no estudo. A primeira etapa, considerada o pré-operatório verificou-se: procedência, idade, cor, paridade, volume uterino, cirurgias anteriores, a segunda etapa, o trans-operatório, observou-se a técnica cirúrgica realizada, e a terceira etapa, o pós-operatório imediato e verificamos o período de permanência hospitalar. **Resultados:** das 157 pacientes avaliadas, 60,5% (95) tinham entre 41 e 50 anos, 76,4% (120) eram multíparas, o volume uterino avaliado pelo exame ultra-sonográfico variou até 300cm<sup>3</sup>, a histerectomia abdominal foi realizada em 66,2% (104) pacientes, enquanto que a histerectomia vaginal sem prolapso foi realizada em 32,4% (51) pacientes, houve conversão cirúrgica em duas pacientes (1,2%). O tempo cirúrgico variou entre 30 a 120 minutos de cirurgia. A permanência hospitalar variou de acordo com a técnica cirúrgica realizada. **Conclusão:** o volume uterino, evidenciado na ultra-sonografia pré-operatória, de até 300 cm<sup>3</sup> não influenciou na escolha da técnica cirúrgica. Nas duas conversões cirúrgicas, o volume uterino não ultrapassou 200cm<sup>3</sup>. O tempo cirúrgico nas histerectomias vaginais foi, em média, uma hora menor, comparado ao tempo médio das histerectomias abdominais. A permanência hospitalar também foi menor na histerectomia vaginal, em média 36 horas, comparada com 48 horas na histerectomia abdominal.